

۱۰۰ آفی تریمازول®

کلوتریمازول شیاف واژینال

• این دارو صرفًاً جهت استعمال واژینال است.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید،

اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

• روزانه یک شیاف (ترجیحاً به هنگام خواب) به مدت ۷ روز متوالی به صورت واژینال استعمال

گردد.

• در دوران بارداری پیش از استفاده از اپلیکاتور با پزشک خود مشورت نمایید.

• برای استعمال، شیاف را از روکش آن خارج کنید و در داخل اپلیکاتور قرار دهید.

• بهتر است به پشت بخوابید و اپلیکاتور را تا حد امکان به صورت عمیق در واژن وارد نمایید. میله اپلیکاتور را فشار دهید تا شیاف درون واژن قرار گیرد.

• قبل و بعد از هربار مصرف، اپلیکاتور را با آب گرم و صابون بشویید و خشک نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

سوزش، خارش، ترشح واژن و یا هر مشکلی که قبیل از درمان وجود نداشته است.

شرایط نگهداری:

• در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از بخ زدگی محافظت نمایید.

• دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر شیاف حاوی ۱۰۰ میلی گرم کلوتریمازول می باشد.

بسته بندی:

هر جعبه حاوی ۷ شیاف واژینال آفی تریمازول® ۱۰۰، به همراه یک اپلیکاتور و برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.

ساخت شرکت ایران آوندفر تهران - ایران

دسته دارویی:

ضد قارچ

موارد مصرف:

درمان عفونت های قارچی واژن (کاندیدیازیس) و تسکین خارش و سوزش های ناشی از آن راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

• این دارو تحت نظارت دکتر داروساز، بدون نسخه پزشک قابل عرضه است.

• دوره درمان را کامل کنید.

• در صورت فراموش کردن یک نوبت استفاده، بلافضله پس از به یاد آوردن دارو را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی رسیده است از

دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

• مصرف دارو را در زمان قاعده‌گی ادامه دهید.

• در طی دوره درمان از تامپون استفاده نکنید.

• از لباس زیر نخی استفاده نمایید.

• در اثر استفاده از این دارو امکان لک شدن لباس زیر وجود دارد.

• در طول درمان و تا ۳ روز پس از قطع درمان از کاندوم استفاده نکنید.

• در صورت عدم بهبودی به مدت ۳ الی ۷ روز و یا بیشتر شدن نشانه های بیماری با پزشک خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به کلوتریمازول و ترکیبات مشابه با پزشک خود مشورت نمایید.

صرف در دوران بارداری: گروه B

در طول دوران بارداری، پیش از مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.

صرف در دوران شیردهی:

ترشح این دارو در شیر انسان کاملاً مشخص نشده است، لذا در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود.

هشدار: