

نام محصول: لوسيون موضعی آفی بتازون ۱٪ درصد

نام ژنریک: بتامتازون

محصولات مشابه:

کلوبتازول، فلوبوسينولون، هيدروكورتيزون، مومتازون، تربامسينولون استونايد، تربامسينولون إن إن

دسته دارویی: گلوکوکورتيکوئید (ضد التهاب)

**موارد مصرف:** این داروها در درمان کوتاه مدت التهاب و خارش پوست ناشی از نیش حشرات، سوختگیهای خفیف، درماتیت آتوپیک، درماتیت تماسی، درماتوز سبوره ای، درماتوز التهابی، اگزما و... عوارض جانبی: مصرف بتامتازون بطور معمول طی یک دوره دوهفته‌ای قابل تحمل می‌باشد، اما در صورت مصرف طولانی مدت واستعمال آن روی سطح وسیع بدن عوارض زیاد ممکن است بر روز نماید. عوارض پوستی: سوزش، خارش، تاول و بدرت کاهش مو در صورت استعمال در قسمت مودار بدن و تحریک چشم در صورت استعمال در نواحی اطراف چشم.

**عوارض سیستمیک:** در صورت مصرف طولانی لوسيون به علت جذب سیستمیک آن ممکن است عوارض زیر بر روز نماید، تضعیف محور هیپوپالاموس هیپوفیز، غده فوق کلیوی، زیادی قند خون و وجود قند در ادرار. مکانیسم اثر: گلوکوکورتيکوئیدها از عرض غشاهاي سلولی عبور كرده و با گيرنده هاي اختصاصي سيتوپلاسمی كمپلکس شده، وارد هسته سلولی می شوند و به mRNA كروماتین متصل و موجب تحریک روند رونویسی DNA شوند. آن ساخت پروتئین های مختلف آنزیمهایی می گردد که تصویر می رود نهایتا مسئول اثرات ضدالتهابی گلوکوکورتيکوئیدهای موضعی باشند. همچنین، پایه های موجود در فرمولاسیون گلوکوکورتيکوئیدهای موضعی با اثر نرم کنندگی، خشک کنندگی یا افزایش جذب این داروها از پوست، ممکن است به اثر درمانی آنها کم کنند. دستور مصرف: بزرگسالان ۲ تا ۳ بار در روز بصورت موضعی می باشد مصرف این دارو در اطفال کوچکتر از ۱۲ سال توصیه نمی شود. توصیه ها: مصرف لوسيون در کودکان به علت جذب سیستمیک آن ممکن است باعث تضعیف محور هیپوپالاموس- هیپوفیز- غده فوق کلیوی گردد. مصرف طولانی مدت بتامتازون موضعی و استعمال روی سطح وسیع بدن و پانسمان ناحیه استعمال، جذب سیستمیک این دارو را زیاد می کند. در صورتی که التهاب و تحریک پوستی ناحیه استعمال کرم بهتر نشده یا بدتر شود استعمال دارو باید قطع گردد. در هنگام استفاده از کرم اگر ناحیه استعمال عفونت نماید با مشورت پزشک معالج از آنتی بیوتیک مناسب استفاده شود. تجویز این دارو فقط توسط پزشک انجام گرفته و باید مدت طولانی تری از آن استفاده نمود. از پانسمان نمودن و استعمال خودداری گردد. در صورت مشاهده هر گونه عوارض جانبی به پزشک معالج خود مراجعه کنید. در صورت هر گونه مسمومیت با این دارو به پزشک مراجعه شود.

**تداخل های دارویی:** تداخل خاصی مشاهده نشده.

**مصرف در دوره بارداری و شیردهی**

در دوران بارداری و شیردهی تنها با توصیه پزشک استفاده گردد(گروه C)

**شرایط نگهداری**

دارو در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از يخ زدگی محافظت گردد. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

# AFIBETHASONE®

آفی بتازون® ۰/۱%

لوسيون موضعی بتامتاژون ۰/۱%

بسته بندی: بطري ۲۰ ميلی ليترى

تركيبات اصلی فرآورده: بتامتاژون (به صورت والرات)

موارد مصرف: درمان التهاب و خارش ضایعات پوستی ناشی از آلرژی،

اگزما، پسوریازیس و نیش حشرات

دسته بندی دارویی: کورتیکوستروئید

بسته بندی : بطري ۲۰ ميلی ليترى

## AFIBETHASONE® 0.1%

Betamethasone 0.1% Topical Lotion

**Active ingredient of the product:** Betamethasone (as valerate)

**Indication:** Treatment of inflammation and itching of the skin caused by allergies, eczema, psoriasis and insect bites

**Category:** Corticosteroid

**Packaging:** 20 mL bottle



**Iran Avandfar**  
Pharmaceutical CO.