

# آفیکایین®

## لیدوکائین ۲/۵ درصد / پریاکائین ۲/۵ درصد کرم موضعی

● جهت اعمال پوستی دردناک تر که منطقه وسیعی از پوست را در بر می گیرد ۲ گرم از کرم را به ازاء هر ۱۰ سانتی متر مریع از پوست به کار ببرید و روی آن را با چسب پانسمان حداقل برای مدت دو ساعت بپوشانید.

● برای درمان با لیزر (تفییر برداشت زگل) یا کردن تاتو و غیره، یک تا ۲ گرم از کرم را به ازاء هر ۱۰ سانتی متر مریع از پوست به کار ببرید.

● برای جراحی پوست اندام تناسلی آقایان لایه ضخیمی از کرم را به مدت ۱۵ دقیقه بر روی پوست قرار دهید.

● برای جراحی پوست اندام تناسلی بانوان لایه ضخیمی از کرم را به مدت ۶۰ دقیقه روی پوست قرار دهید.

عوارض جانبی:  
هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

احساس سوزش، تورم، خارش، بثورات جلدی و سفیدی یا سرخی بیش از حد پوست

شرایط نگهداری:  
در ماهای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از بین زدگی محافظت نمایید.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر ۱۰۰ گرم کرم حاوی ۲/۵ گرم لیدوکائین و ۲/۵ گرم پریلوکائین می باشد.

بسته بندی:  
هر جعبه حاوی یک تیوب ۳۰ گرمی کرم موضعی آفیکایین<sup>®</sup>، به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.

دسته دارویی:  
بی حس کننده موضعی  
موارد مصرف:  
به عنوان بی حس کننده موضعی در جراحی های کوچک، لیزر و تاتو به کار می رود.

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

● این دارو برای بیماران قاعی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

● قبل از استعمال این دارو در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر با پزشک مشورت نمایید:

● مصرف طولانی مدت استامینوفن، کلروکین، نیتروفورانتوتین، نیتروگلیسیرین، فنوباربیتال و فنی توئین.

● از استفاده این دارو برای نوزادانی که زودتر از موعده به دنیا آمدند و نوزادان کمتر از ۱۲ ماه به دلیل ایجاد متهم‌گلوبینی اجتناب شود.

موارد منع مصرف:

● در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به لیدوکائین، پریلوکائین یا هر نوع بی حس کننده موضعی دیگر با پزشک خود مشورت نمایید.

● در صورت وجود مت هموگلوبینمی، کمبود آنزیم G6PD نارسایی شدید عملکرد کبد، اگزما، سوختگی، زخم و یا بردگی پوست با پزشک خود مشورت نمایید.

● مصرف در دوران بارداری: گروه B

در این مورد مشاهدات کافی مبتنی بر مطالعات انسانی وجود ندارد.

● مصرف در دوران شیردهی:

توضیح این دارو در شیر انسان کاملاً مشخص نشده است، لذا در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود.

هشدار:

● این دارو صرفاً جهت استعمال خارجی است.

● از تماس دارو با چشم خودداری نمایید. در صورت تماس اتفاقی بلافتسله چشم را با آب و یا محلول سدیم کلراید ۰/۹ درصد شستشو دهید.

● از استعمال دارو بر روی زخم های باز، بردگی، سوختگی، پوست متنبه و نیز از تماس آن بالبها و دهان خودداری نمایید.

● از به کار بردن دارو بر روی گوش خودداری نمایید. مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

● مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف

معمول دارو به شرح ذیل است:

● برای بی حسی موضعی پوست، لایه ضخیمی از کرم را بر روی

پوست بمالید و با چسب پانسمان روی آن را بپوشانید.