

آفیکازون® ۵۰ میکروگرم در هر دوز


فلوتیکازون پروپیوئات

اسپری بینی

شایط نگهداری:
در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از بیخ زدگی محافظت نمایید.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر دوز (پاف) حاوی ۵۰ میکروگرم فلوتیکازون پروپیوئات است. هر ظرف محتوی ۱۲۰ پاف می باشد.

بسته بندی:
هر جعبه حاوی یک اسپری بینی ۱۵ میلی لیتری آفیکازون® ۵۰ میکروگرم در هر دوز، به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.



بعد از هر بار مصرف، قسمت سر اسپری بینی را با یک دستمال تمیز پاک نموده، سپس دربوش اسپری را در جای خود قرار دهید.
از اسپری شدن دارو درون چشم خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موارز اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
خشکی و تحریک بینی، گلو درد، زخم بینی، واکنش های آлерژیک، سرف، سردرد، حالت تهوع، کاندیدیازیس، تورم صورت، لب و پلک ها، عطسه

ساخت شرکت ایران اویندفر تهران - ایران

بعاد ۱۰ در
پشت و رو

Panton 3385 C

رنگ زرد به صورت شماتیک میباشد و رنگ اصلی نوار بالا کد نوشته شو پنتون رنگ ما می باشد

آفیکازون® ۵۰ میکروگرم در هر دوز

فلوتیکازون پروپیوئات

اسپری بینی

دسته دارویی:
کورتیکوستروئید

موارد مصرف:
درمان رینیت های آлерژیک فصلی و دائمی و رینیت های غیر آлерژیک

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو صرفاً برای مصرف از راه بینی است.
- مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید.
اما مقادیر مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:
• بزرگسالان و کودکان ۱۱ سال و بالاتر: روزانه ۲ پاف از دارو را در هر سوراخ بینی اسپری نمایید.
• کودکان ۴ تا ۱۱ سال: هر روز صبح یک تا ۲ پاف از دارو را در هر سوراخ بینی اسپری نمایید.

روش مصرف دارو:
• قبل از استفاده بینی را تمیز نمایید.
• ابتدا ظرف دارو را به آرامی تکان داده و سپس دربوش سر اسپری را بردارید.

در اولین نوبت مصرف دارو پا هنگامی که از اسپری به مدت طولانی استفاده نکردید، اسپری را دور از خود نگه داشته و در هوا ۴ تا ۶ بار اسپری کنید. پس از این عمل اسپری مقدار مشخص شده در هر پاف (۵۰ میکروگرم فلوتیکازون) را تأمین می نمایید.

• دارو را بیش از مقدار تجویز شده استفاده نکنید.
• در صورت عدم بھبودی طی ۳ هفته پزشک را مطلع سازید.
• بیمارانی که زخم تیغه میانی بینی، جراحی بینی یا سایر ضربه به بینی داشته اند، با پزشک خود مشورت نمایند.

• مصرف این دارو در کودکان زیر ۴ سال توصیه نمی شود.
• قبل از مصرف ظرف دارو را خوب تکان دهید.
• پس از هر بار مصرف دربوش ظرف را محکم ببندید.

موارد منع مصرف:
در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به فلوتیکازون با پزشک خود مشورت نمایید.
مصرف در دوران بارداری: گروه C
مصرف این دارو در دوران بارداری با تجویز پزشک صورت گیرد.

