

آفیژیل® مترونیدازول شیاف واژینال

صرف این دارو به علت ترشح آن در شیر انسان در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود، لذا در طول دوران شیردهی پیش از مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.

- این دارو صرفاً جهت استعمال واژینال است.
- استعمال این دارو ممکن است سبب سرگیجه شود.
- مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:
به مدت ده شب متواتی، هر شب یک شیاف در هنگام خواب به صورت واژینال استعمال شود.
- برای استعمال، شیاف را از روکش آن خارج کنید و در داخل اپلیکاتور قرار دهید. بهتر است به پشت بخواهید و اپلیکاتور را تا آنجا که ممکن است داخل واژن وارد نمایید. میله اپلیکاتور را فشار دهید تا شیاف درون واژن قرار گیرد. قبل و بعد از هر بار مصرف، اپلیکاتور را با آب گرم و صابون بشویید و خشک کنید.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موزات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
- ترشح، سوزش، خارش، درد شکم، درد در زمان مقاربت، عفونت قارچی واژن، سردرد و سرگیجه
 - شرایط نگهداری:
 - در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از بخ زدگی محافظت نمایید.
 - دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 - دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر شیاف حاوی ۵۰۰ میلی گرم مترونیدازول می‌باشد.
بسته بندی:

هر جعبه حاوی ۱۰ شیاف واژینال آفیژیل® ۵۰ و یک اپلیکاتور به همراه برگ راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

دسته دارویی:

خد باکتری

موارد مصرف:

درمان عفونت‌های باکتریایی واژن و تریکومونیازیس

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف

صحیح دارو:

• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

• در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خون، سایمینیدین، دیسولفیرام، لیتیم، فنی توئین و الکل، پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

• در صورت ابتلاء به صرع، بیماری‌های اعصاب، نقص عملکرد کبدی و بیماری خونی مزایای مصرف دارو بر مضرات آن باید در نظر گرفته شود.

• دوره درمان را کامل نمایید.

• در طول درمان با این دارو از انجام مقایبت خودداری گردد و از کاندوم استفاده نشود.

• در صورتی که درمان برای عفونت تریکومونایی صورت می‌گیرد همسر بیمار نیز باید همزمان تحت درمان مناسب قرار بگیرد.

• مصرف دارو را در زمان قاعدگی ادامه دهید.

• در صورتی که پس از جند روز بهبودی حاصل نشد به پزشک خود مراجعه نمایید.

• در صورت فراموش کردن یک نوبت، بلافضله بعد از بسه یاد آوردن دارو را مصرف کنید. اما اگر زمان نوبت بعدی رسیده است از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

• در طول مصرف این دارو از لباس زیر نخی استفاده نمایید.

• در ضمن مصرف این دارو امکان لک شدن لباس زیر وجود دارد.

• در طی دوره درمان از تامپون استفاده نکنید.

• دست‌ها را قبیل و بعد از مصرف دارو بشویید.

موارد منع مصرف:

• در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به مترونیدازول با پزشک خود مشورت نمایید.

• مصرف در دوران بارداری: گروه B

در طول دوران بارداری، پیش از مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.

مصرف در دوران شیردهی: