



- ۱- نام محصول : محلول موضعی آفیندامایسین ۱ درصد
- ۲- نام ژنریک : کلیندامایسین
- ۳- محصولات مشابه : آزلائیک اسید ۲۰٪ ، اریترومایسین ۲٪ و ۴٪ ، مترونیدازول ۰٫۷۵٪ ، موپیروسین ۲٪ ، تتراساکلین ۳٪.
- ۴- دسته دارویی : آنتی بیوتیک (ضد باکتری)
- ۵- موارد مصرف : درمان موضعی آکنه و لگاریس (جوش غرور جوانی)
- ۶- عملکرد فارماکودینامیک (اثر دارو بر ساختمان موجودات زنده) : به صورت قابل برگشت به ساب یونیت S ۵۰ ریبوزومال متصل می شود و از تشکیل باند پپتیدی توسط باکتری جلوگیری می کند. بنابراین سنتز پروتئین توسط باکتری مهار می شود. باکتریو استاتیک و باکتر یوسید بودن آن بستگی به غلظت دارو، محل عفونت و نوع ارگانسیم دارد.
- ۷- دستور مصرف : ابتدا دست هایتان را بشوئید . یک لایه نازک از محلول موضعی را بر روی ناحیه مورد نظر پوست بمالید و در صورت لزوم موضع را کمی مالش دهید تا دارو به طور کامل داخل پوست نفوذ نماید . پس از اتمام کار نیز مجدداً دستهایتان را بشوئید.
- ۸- توصیه ها: دارو را طبق برنامه توصیه شده و به طور کامل تا پایان دوره درمان مورد استفاده قرار دهید. قبل از استعمال دارو، موضع را به خوبی با آب شسته و سپس خشک نمایید. در مواقع استفاده از محلول موضعی «کلیندامایسین» پس از شستشوی موضع یا اصلاح صورت بهتر است ۳۰ دقیقه صبر کرده و سپس فر آورده را بر روی موضع بمالید. در طول مدت مصرف این فر آورده، از شستشوی مکرر پوست و نواحی مبتلا اجتناب ورزید. در صورت عدم بهبود آکنه پس از ۶ هفته درمان با این دارو، به پزشک معالجتان مراجعه کنید.
- ۹- مصرف در دوره بارداری : مجاز، به شرط آن که فوائد مصرف دارو بر آثار سوء احتمالی آن بر تری داشته باشند (گروه B).
- ۱۰- عوارض جانبی : مصرف از راه موضعی ممکن است سوزش گذرا، خشکی پوست، خارش و قرمزی ایجاد کند.
- ۱۱- موارد منع مصرف و احتیاط: در صورت داشتن هر گونه حساسیت به دارو یا مشتقات لینکوزامید نباید مصرف شود. همچنین از تماس دارو با چشم باید خودداری شود. در صورت داشتن حساسیت پوستی باید با احتیاط مصرف شود.
- ۱۲- تداخل دارویی : استفاده همزمان از اریترومایسین تاثیر درمانی هر دو دارو را کاهش می دهد. همچنین مصرف همزمان ترکیبات ضد آکنه با محلول موضعی کلیندامایسین می تواند سبب التهاب بیشتر یا خشکی پوست شود.
- ۱۳- شرایط نگهداری : دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد (ترجیحا ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد) و از یخ زدن محافظت شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- ۱۴- مصرف در دوره شیردهی : ترشح (کلیندامایسین) موجود در این فر آورده ها در شیر مادر مشخص نشده و در عین حال با توجه به کم بودن مقدار مصرف دارو از راه موضعی و همچنین ناچیز بودن درصدی از دارو که به داخل بدن جذب می گردد، احتمال راهیابی مقادیر قابل توجه آن به داخل شیر مادر بعید به نظر می رسد.

AFINDAMYCIN®

آفیندامایسین ۱٪

محلول موضعی کلیندامایسین ۱٪

ترکیبات اصلی فرآورده: کلیندامایسین (به صورت فسفات)

موارد مصرف: درمان آکنه و لگاریس، درمان عفونت های باکتریال پوستی ناشی

از میکروارگانیزم های حساس در بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال

دسته بندی دارویی: آنتی بیوتیک موضعی ضد آکنه مشتق لینکومایسین

بسته بندی: بطری ۶۰ میلی لیتری



AFINDAMYCIN® 1%

Clindamycin 1% Topical Solution

Active ingredient of the product: Clindamycin
(as phosphate)

Indication: Acne vulgaris, treatment of bacterial skin infections caused by susceptible microorganisms in adults and children over 12 years

Category: Topical antibiotic, anti-acne

Packaging: 60mL bottle



Iran
Avandfar
Pharmaceutical CO.