

آفیپلکس® ۵ درصد

آسیکلولویر

کرم موضعی

آسیکلولویر با پزشک خود مشورت نمایید.

صرف در دوران بارداری: گروه B

در طول دوران بارداری، پیش از صرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.

صرف در دوران شیردهی:

ترشح این دارو در شیر انسان کاملاً مشخص نشده است، لذا در دوران شیردهی با اختیاط صرف شود.

هشدار:

- این دارو صرفاً جهت استعمال خارجی است.
- از استفاده دارو اطراف چشم و بر روی غشای مخاطی خودداری نمایید.

دوره درمان را کامل کنید.

مقدار و نحوه صحیح صرف دارو:

مقدار صرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار صرف معمول دارو به شرح ذیل است:

مقدار کافی از کرم را چهار تا شش بار در روز روی موضع بمالید.

طول مدت درمان ۱۰ روز می باشد.

عارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

درد خفیف، سوزش و خارش

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از بخشی محافظت نمایید.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر ۱۰۰ گرم کرم حاوی ۵ گرم آسیکلولویر می باشد.

بسته بندی:

هر جعبه حاوی یک تیوب ۱۰ گرمی کرم موضعی آفیپلکس® ۵ درصد، به همراه برگه راهنمای صرف دارو می باشد.

دسته دارویی:

ضد ویروس

موارد مصرف:

درمان عفونت‌های ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس

و زونا

راهنمایی‌های عمومی برای صرف صحیح دارو:

• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است،

لذا از صرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

• بلافضله پس از مشاهده اولین علائم بیماری درمان را شروع کنید.

• برای جلوگیری از انتشار عفونت در هنگام استفاده از کرم آسیکلولویر، از دستکش لاستیکی یا انگشت پوش استفاده کنید.

• مقدار کافی از کرم را بر روی تبخال استفاده نمایید به طوری که سطح ضایعات به طور کامل به وسیله کرم پوشانده شود.

• دارو را بیش از مقدار و مدت زمان تجویز شده مصرف ننمایید.

• در صورت فراموش کردن یک نوبت، دارو را هرچه سریع‌تر استفاده کنید ولی اگر مدت کمی تا نوبت بعدی مانده بود، از نوبت فراموش شده صرفه نظر نمایید.

• در صورت عدم بهبودی علائم بیماری طی یک هفتنه از شروع درمان و نیز در صورت بدتر شدن علائم، پزشک خود را مطلع سازید.

• خانم‌های مبتلا به تبخال تناسلی بایستی محل ضایعه را تا حد امکان خشک و تمیز نگهدازند و از لباس زیر گشاد استفاده نمایند.

• در صورت وجود تبخال در ناحیه تناسلی بایستی از نزدیکی خودداری شود. کانونم می تواند به جلوگیری از سرایت ویروس هرپس کمک کند، ولی ژل های اسپرم کش یا دیافراگم در پیشگیری از سرایت این بیماری نقشی ندارند.

• پس از هر بار صرف در پوش تیوب را محکم ببندید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به