

آفی رکتیل®

آنچی هموروئید

شیاف مقعدی

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:
حداکثر مقدار مصرف مجاز روزانه سه عدد شیاف می‌باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
- تورم صورت، لب‌ها، زبان و یا سایر نقاط بدن، اختلال در تنفس، خس خس سینه، تنفس کوتاه و مقطعی و درماتیت تماسی (سوژش و خارش)
- ایجاد زخم، خون‌ریزی، خشکی، سوژش، خارش یا درد در ناحیه مقدud

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از يخ‌زدگی محافظت نمایید.
- دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر شیاف حاوی ۵ میلی‌گرم هیدروکورتیزون استات، ۶۰ میلی‌گرم لیدوکائین، ۵۰ میلی‌گرم آلومینیوم ساب استات و ۴۰۰ میلی‌گرم زینک اکساید می‌باشد.
بسته بندی:

هر جعبه حاوی ۱۰ شیاف مقعدی آفی‌رکتیل® به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

دسته دارویی:

کورتیکوستروئید و بی‌حس کننده موضعی
موارد مصرف:

تسکین علائم هموروئید از قبیل خارش، درد و التهاب ناحیه مقعدی

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- قبل و بعد از مصرف دارو دست‌های خود را بشویید.

- این دارو تحت نظرارت دکتر داروساز، بدون نسخه پزشک قابل عرضه خواهد بود.

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به لیدوکائین، هیدروکورتیزون و یا سایر اجزای دارو و همچنین، داشتن سایقه حساسیت نسبت به بی‌حس کننده‌های موضعی یا انسواع کورتیکوستروئیدها، با پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت ابتلاء به نقص عملکرد کبدی و یا وجود عفونت‌های درمان نشده در موضع، در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
صرف در دوران بارداری: گروه C

در صورت بارداری یا تصمیم به باردار شدن، قبل از مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.
صرف در دوران شیردهی:

صرف این دارو در دوران شیردهی با تجویز پزشک صورت گیرد.
هشدار:

- این دارو صرفاً جهت استعمال مقعدی است.

- پیش از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- نازک یا شکننده شدن پوست در موضع مصرف - وجود عفونت در موضع مصرف

- مصرف سایر بی‌حس کننده‌های موضعی و دروهای تنظیم کننده ضربان قلب