

# آفیزوناید® ۶۴ میکروگرم در هر دوز

## بودزنوناید

### اسپری بینی

هر دوز (پاف) حاوی ۶۴ میکروگرم بودزنوناید است.  
هر ظرف دارو محتوی ۱۲۰ پاف می باشد.  
بسته بندی:  
هر جعبه حاوی یک اسپری بینی ۸ میلی لیتری آفیزوناید® ۶۴ میکروگرم در هر دوز، به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.

سر را کمی به جلو خم نمایید. سر اسپری را داخل یکی از سوراخ های بینی قرار دهید، با دست سوراخ دیگر بینی را مسدود نمایید. در حالی که از بینی و با دهان بسته تنفس می کنید (در هنگام عمل را برای سوراخ دیگر بینی تکرار نمایید).



بعد از هر بار مصرف، قسمت سر اسپری بینی را با یک دستمال تمیز پاک نموده، سپس درپوش اسپری را در جای خود قرار دهید.  
عوارض جانبی:

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

تحریک بینی، خشونت صدا، سرفه، درماتیت، کاندیدیازیس، سرگیجه، خستگی مفرط، تهوع، آبریزش بینی، کمپر و خارش گلو شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از بخ زدگی محافظت نمایید.  
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

# آفیزوناید® ۶۴ میکروگرم در هر دوز

## بودزنوناید

### اسپری بینی

دسته دارویی:  
کورنیکوسترونید  
موارد مصرف:  
برطرف کردن علایم رینیت آرژیک فصلی یا دائمی، رینیت دائمی غیر آرژیک و بولیب راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

در صورت ابتلاء به عفونت های قارچی، باکتریایی یا عقوتين سیستمیک ویروسی، هریس چشمی، سل، آب سیاه چشم و اختلال عملکرد بد با پزشک خود مشورت نمایید.

بیمارانی که زخم تیغه میانی بینی، جراحی بینی یا سابقه ضربه به بینی داشته اند، پیش از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایند.

این دارو را بیش از مقدار تجویز شده و به مدت طولانی مصرف نکنید.  
در صورت برطرف نشدن علایم بیماری طی ۳ هفته یا بیشتر شدن علایم، پزشک را مطلع سازید.

قبل از مصرف ظرف دارو را خوب تکان دهید.  
بیش از هر بار مصرف درپوش ظرف را محکم ببندید.

موارد منع مصرف:  
در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به بودزنوناید و ترکیبات مشابه با پزشک خود مشورت نمایید.

صرف این دارو در دوران بارداری: گروه C مصرف این دارو در دوران بارداری با تجویز پزشک صورت گیرد.

صرف در دوران شیردهی:  
این دارو در دوران شیردهی با تجویز پزشک مصرف شود.  
همشدار:

