

تتراسایکلین

تتراسایکلین‌ها خانواده‌ای از آنتی بیوتیک‌های باکتری کش هستند که در مقابل باکتری‌های مختلف گرم منفی و گرم مثبت، مایکو پلاسماهای، کلامیدیاها و ریکتزاها فعال می‌باشند. تتراسایکلین برای درمان آکنه نیز استفاده می‌شود. همچنین به دلیل جذب آن توسط استخوان از آن به عنوان نشانگر در بررسی‌های رشد استخوان‌ها در بیوپسی‌های انسانی استفاده می‌شود. این داروها با اتصال به ریبوزوم از پروتئین سازی جلوگیری می‌کنند. تتراسایکلین‌های گوناگون (مثل داکسی سایکلین، مینوسایکلین، اکسی تتراسایکلین و...) فعالیت ضد میکروبی مشابه ولی خواص فارماکولوژیک متفاوت دارند.

نام ژنریک: تتراسایکلین

نام محصول: آفی تترین

دسته دارویی: آنتی بیوتیک

طبقه بندی در بارداری: گروه D

روش و مقدار مصرف

* بالغین و کودکان: یک یا دو بار در روز بر روی موضع مالیده شود.

مکانیسم اثر:

* تتراسایکلین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است که بعد از انتقال فعال به درون باکتری، به صورت برگشت پذیر به زیر واحد ۳۰ S ریبوزوم باکتری متصل شده و باعث مهار سنتز بروتئین توسط باکتری می‌گردد.

عفونت باکتریال پوست و بافت نرم، به طور کلی به هجوم انواع مختلف باکتری‌ها به لایه‌های مختلف پوست - اپیدرم، درم و بافت‌های زیرجلدی اطلاق می‌شود. عفونت ممکن است به شکل موضعی مانند آبسه پوستی بروز کند که شامل تجمع چرک در منطقه‌ای از پوست است....

این ناحیه به شدت قرمز و متورم می‌شود. عفونت ممکن است به شکل منتشر باشد. نظیر سلولیت یا اریسیپلایس. در نوع دیگر تقسیم‌بندی، عفونت‌های پوست و بافت نرم که شیوع نسبتاً زیادی دارند، به انواع سطحی، متوسط، عمیق و شدید طبقه‌بندی می‌شوند. در بیشتر موارد عفونت‌های پوست و بافت نرم، ساده و خفیف هستند و بیمار با درمان آنتی بیوتیکی خوارکی و بدون نیاز به بستره درمان می‌شود، اما در حدود ۱۰ درصد از موارد به دلیل عفونت‌های پیچیده پوست و بافت نرم، نیازمند بستره بیمارستانی هستند. همانطور که می‌دانیم پوست از لایه‌های مختلفی تشکیل شده که آنها در مجموع اولین سد دفاعی بدن فرد سالم در برابر عفونت‌ها هستند. عوامل مختلفی این عضوراً مستعد ابتلاء به عفونت می‌کنند، همچون آسیب خارجی ترین لایه پوست، تراکم بالای باکتری‌ها و جریان ناکافی خون موضع. عواملی نظیر دیابت قندی، جریان ناکافی خون عروق محیطی، نوروباتی و ترومای جراحی را نیز باید در نظر گرفت. انواع عفونت‌های پوست و بافت نرم

عفونت‌های اولیه در پوست سالم رخ می‌دهند و اغلب مسبب آنان استافیلیوکوک اورئوس یا استرپتوکوک گروه A است. عفونت‌های ثانویه معمولاً در نتیجه وجود عامل مستعد کننده اتفاق می‌افتد و ممکن است عفونت ساده یا پیچیده ایجاد کنند. براساس تقسیم‌بندی سازمان غذا و داروی آمریکا، عفونت‌های پیچیده بافت نرم شامل درگیری پوست غیرطبیعی یا زخم است. این عفونت در بیماران با دستگاه ایمنی سرکوب شده مشاهده می‌شوند یا شامل عفونت‌هایی است که نیاز به مداخلات جراحی دارند.

براساس آمارهای موجود، استرپتوکوکوس و استافیلیوکوک اورئوس، شایع ترین میکرووارگانیسم‌های دخیل در بیشتر موارد عفونت‌های باکتریال پوست و بافت نرم هستند. معاینه بالینی دقیق برای تشخیص شدت عفونت ضروری است. علایم موضعی پیشنهاد کننده عفونت جدی پوست و بافت نرم عبارتند از تاول، خونریزی از ضایعات، بی حسی یا درد. درد شدید ناهماهنگ با یافته‌های فیزیکی، حساسیت در لمس، بی حسی و گزگز اطراف ناحیه زخم، اغلب نشان دهنده نکروز بافتی است. افت فشار خون، تاکی کاردی، هیپوترمی یا تب و علایم روانی، نشان دهنده درگیری به مراتب شدیدتری هستند.

درمان‌های غیردارویی

جراحی و درناز، درمان اصلی عفونت‌های پوست و بافت نرم - مثلاً در مورد آبسه - محسوب می‌شوند. این اقدام، چرک و بخش اعظم میکروب‌های مسبب بیماری را از منطقه تخلیه می‌کند. اعتقاد بر این است که اکسیژن هیپرباریک نیز ممکن است ترمیم زخم را تسريع کند. از نظر تئوری، غلظت بالای اکسیژن در بافت‌های عفونی تکثیر میکرووارگانیسم را کند کرده و به بمبود زخم کمک می‌کند.

AFITETRIN®

شرکت



آفی تترین® ۳%
پماد موضعی تتراسایکلین ۳%
ترکیبات اصلی فرآورده: تتراسایکلین هیدروکلرید
موارد مصرف: درمان عفونت های پوستی ناشی از
میکروارگانیسم های حساس
دسته بندی دارویی: آنتی بیوتیک موضعی، آنتی باکتریال
بسته بندی: تیوب ۱۵ گرمی

AFITETRIN® 3%

Tetracycline 3% Topical Ointment

Active ingredient of the product: Tetracycline hydrochloride

Indication: Treatment of skin infections caused by susceptible microorganisms

Category: Topical antibiotic, antibacterial

Packaging: 15g tube



Iran
Avandfar
Pharmaceutical CO.