

# لایسترین<sup>®</sup> ۵ درصد

## پرمترین کرم موضعی

دسته دارویی:

پیرتروئید نابودکننده بندپایان

موارد مصرف:

درمان آلودگی به انگل عامل بیماری گال و شیش

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

• استعمال این دارو برای کودکان ۲ ماهه تا ۲ ساله تحت نظارت پزشک صورت گیرد.

• تمامی لباس ها و مخصوصاً لباس های زیر، حوله ها و لوازم خواب بیمار، بایستی با استفاده از آب گرم و صابون شسته شود و با حرارت زیاد خشک گردد.

• فرد مبتلا به بیماری گال و افرادی که در تماس نزدیک و مداوم با بیمار می باشند همزمان نیازمند درمان هستند.

• استعمال محلول های تسکین دهنده مانند محلول کالامین و استفاده از آنتی هیستامین ها یا کورتیکواستروئیدها می تواند موجب کاهش خارش پوست شود.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به پرمترین و ترکیبات مشابه با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری: گروه **B**  
در این مورد مشاهدات کافی مبتنی بر مطالعات انسانی وجود ندارد.

مصرف در دوران شیردهی:

ترشح این دارو در شیر انسان کاملاً مشخص نشده است، لذا در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود. هشدار:

• این دارو صرفاً جهت استعمال خارجی است.

• از استعمال این دارو بر روی پوست های آسیب دیده و یا پوست هایی که دارای عفونت ثانویه هستند خودداری نمایید.

• از تماس دارو با چشم ها و سطوح مخاطی خودداری شود.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- درمان شیش

برای افراد بالاتر از ۱۸ سال، مقدار کافی از کرم را به تمام نواحی بدن مالیده، بگذارید به طور طبیعی خشک شود، پس از ۱۲ ساعت تمام بدن را بشویید. استعمال دارو را بعد از ۷ روز دوباره تکرار نمایید.

- درمان گال

ابتدا پوست خود را شسته و خشک نمایید. مقدار کافی از کرم را روی تمام بدن از گردن تا کف پا بمالید، پس از ۸ تا ۱۲ ساعت پوست را بشویید. در صورتی که در طول این مدت دست ها با آب و صابون شسته شدند باید استعمال دارو بر روی دست ها تکرار شود. استعمال دارو را بعد از ۷ روز دوباره تکرار نمایید. عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید: خارش، سوزش، ادم و بثورات جلدی

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از یخ زدگی محافظت نمایید.  
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر ۱۰۰ گرم کرم حاوی ۵ گرم پرمترین می باشد.

بسته بندی:

هر جعبه حاوی یک تیوب ۳۰ گرمی کرم موضعی لایسترین<sup>®</sup> ۵ درصد، به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.