

# پیروژل® ۵/۰ درصد

## پیروکسیکام

### ژل موضعی

مقدار مصرف هر دارو را پیشک معین می نماید.  
اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- روزانه ۳ الی ۴ بار بر روی موضع بمالید.
  - توصیه می شود بعد از استفاده دارو دست ها را بشویید.
- عوارض جانبی:
- هدارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند. در صورت بروز عوارض زیر با پیشک یا داروساز مشورت نمایید:  
حساسیت به نور، راش پوستی  
شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از بخ زدگی محافظت نمایید.  
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر ۱۰۰ گرم ژل حاوی ۵٪ ۰ گرم پیروکسیکام می باشد.

بسته بندی:

هر جعبه حاوی یک تیوب ۶۰ گرمی ژل موضعی پیروژل® ۵/۰ درصد به همراه یک برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.

دسته دارویی:

ضد التهاب غیراسترتوئیدی

موارد مصرف:

تسکین درد و کاهش التهاب مفاصل ناشی از آرتربیت روماتوئید، آرتروز و دردهای عضلانی راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو: • این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.  
• این دارو تحت نظارت دکتر داروساز، بدون نسخه پیشک قابل عرضه است.  
• مصرف بیش از حد این دارو می تواند موجب اثرات سیستمیک مانند حساسیت شدید و آسم شود.

• مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود.  
• از قرار گرفتن بیش از حد موضع درمان در معرض نور آفتاب خودداری شود.  
• از تماس دارو با چشم ها، سطوح مخاطی و آسیب دیده پوست خودداری کنید.

• از پانسمان موضع خودداری نمایید.  
موارد منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به پیروکسیکام و ترکیبات مشابه با پیشک مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:  
از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی اجتناب گردد.  
هشدار:

این دارو صرفاً جهت استعمال خارجی است.  
مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو: