

# سلنیوم سولفاید - ایروکس® / ۲/۵ درصد

## سلنیوم سولفاید شامپو (لوسیون)

- درمان تینه آ ورسیکالر روزی یکبار حداقل به مدت ۷ روز طبق دستور ذیل استفاده شود:
- ناحیه مورد استفاده را مرطوب کنید، بطری شامپو را خوب تکان دهید، شامپو را با کمی آب در موضع مالش دهید تا کف نماید.
- اجازه دهید کف شامپو حداقل ۱۰ دقیقه روی موضع بماند و سپس آبکشی نماید.
- درمان شوره و درماتیت سبورئیک به مدت دو هفته و هر هفته دوبار طبق دستور ذیل استفاده شود:

پوست سر و موها را با آب مرطوب کنید، بطری شامپو را خوب تکان دهید. مقدار کافی از شامپو را روی سر بزیبد و ماساژ دهید. اجازه دهید کف شامپو به مدت ۳ دقیقه روی سر باقی بماند و سپس موها را آبکشی نماید. این عمل را دوباره تکرار کنید. جهت جلوگیری از بازگشت مجدد شوره سر، دارو را به مدت دوهفته دیگر به صورت هفت‌های یکبار ادامه دهید و پس از آن در موقع لزوم استفاده نمایید.

عوارض جانبی:  
هر دارو به موازن اثرات درمانی ممکن است باعث برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

خشکی یا چرب شدن موها یا پوست سر، بی رنگ شدن و ریزش مو  
رشایط نگهداری:  
در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از یخ زدگی محافظت نمایید.  
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر ۱۰۰ میلی لیتر شامپو حاوی ۲/۵ گرم سلنیوم سولفاید می‌باشد.

بسته بندی:

هر جعبه حاوی یک بطری ۱۵۰ میلی لیتری شامپو سلنیوم سولفاید-ایروکس® ۲/۵ درصد به همراه برگه راهنمای مصرف می‌باشد.

ساخت شرکت ایران آوندفر تهران - ایران

دسته دارویی: ضد قارچ و ضد شوره  
موارد مصرف:  
درمان موارد ابتلا به تینه آ ورسیکالر، درماتیت سبورئیک و شوره سر

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:  
• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.  
• این دارو را تا ۴۸ ساعت بعد از زنگ کردن، صاف یا فر کردن موها استفاده نکنید.

• بطری شامپو را قبل از مصرف خوب تکان دهید.  
• پس از هر بار مصرف در پوش بطری را بیندید.  
• در صورت برخی حساسیت، مصرف شامپو را قطع کنید و با پزشک مشورت نمایید.  
• پس از مصرف دست‌ها را کاملاً بشویید.

موارد منع مصرف:  
در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به سلنیوم سولفاید و یا مواد متشکله شامپوها با پزشک خود مشورت نمایید.

صرف در دوران بارداری: گروه C  
صرف این دارو در دوران بارداری با تجویز پزشک صورت گیرید.

صرف در دوران شیردهی:  
صرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت بگیرید.

هشدار:  
• این دارو صرفاً جهت استعمال خارجی است.  
• مصرف این دارو برای کودکان زیر ۵ سال توصیه نمی‌گردد.  
• از بروز شامپو به چشم‌ها مانع نماید و در صورت تماس اتفاقی، بلا فاصله چشم‌ها را با آب کافی شستشو دهید.  
• از مصرف این دارو بر روی پوست آسیب دیده یا ملتهب و سطوح مخاطی خودداری نکنید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:  
روش استفاده از این دارو را پزشک معین می‌کند. در صورتی که دستور خاصی ارائه نشده باشد، به روش زیر عمل کنید: