

ابعاد ۱۰ × ۱۴

panton 422 C

## سیلبرن® یک درصد

سیلورسولفادیازین  
کرم موضعی

دسته دارویی:  
ضد باکتری، ضد قارچ  
مواد مصرف:

کمک به پیشگیری و درمان عفونت های پوستی  
ناشی از بردگی، خراش، پیوند پوستی، زخم و

سوختگی درجه ۲ و ۳

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

• این دارو تحت نظرات دکتر داروساز، بدون نسخه پزشک قابل عرضه است.

• در صورت ابتلاء به اختلال خونی، کمیود آنزیم G6PD، پورفیریا، نقص عملکرد کبدی و کلیوی، مراحتی مصرف دارو در برابر مضرات آن باید در نظر گرفته شود.

• دوره درمان را کامل کنید.

• مصرف این دارو در نوزادان نارس و یا اطفال زیر ۲ ماه به دلیل احتمال ایجاد کرنیکتروس توصیه نمی شود.

• در صورت فراموش کردن یک نوبت استفاده، بلافضله پس از به یاد آوردن، دارو را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی رسیده است از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

• از تنس دارو با چشم، بینی و دهان خودداری شود.

• پس از هر بار مصرف در تیوب را محکم ببندید.

موارد منع مصرف:

• در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به سیلورسولفادیازین، سولفونامیدها و ترکیبات مشابه با پزشک خود مشورت نمایید.

B مصرف در دوران بارداری: گروه در طول بارداری، پیش از مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.

مصرف در دوران شیردهی:

ترشح این دارو در شیر انسان کاملاً مشخص نشده است، لذا پیش از مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.

هشدار:

ساخت شرکت ایران آوندفر تهران - ایران

• این دارو صرفاً برای استعمال خارجی است.  
• مصرف دارو ممکن است موجب تغییر رنگ پوست گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:  
مقدار مصرف هر دارو را برشک معین می نماید.

اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:  
پوست سوخته پاک و تمیز نمایید.

• قفل از استفاده، موضع را از یافته های مرده یا پاک استفاده پاک و تمیز نمایید.

• یک لایه نسازک از کرم را یک یا دو بار در روز با دستکش استریل روی موضع نمایید.

• پس از مالیدن کرم، میتوانید روی موضع را ببوشانید.

• پس از شستشو و استحمام و یا پاک شدن کرم، موضع را مجدداً با کرم ببوشانید.

عوارض جانبی:  
هربارو به موادرات اثرات درمانی ممکن است باعث

بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند در صورت

بروز عوارض زیر با برشک یا دارو ساز مشورت نمایید:

تاوا، پوست اندامخان، شل شدن پوست، قرمی،  
خارش شدید، افزایش حساسیت پوست به نور

خورشید، تغییر رنگ پوست و راش پوستی  
شرابط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از بیخ زدگی محافظت نمایید.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر ۱۰۰ گرم کرم حاوی یک گرم سیلورسولفادیازین می باشد.

بسنده بندی:  
هر جعبه حاوی یک تیوب ۵۰ گرمی کرم موضعی سیلبرن® یک درصد به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.