

نام ژنریک : لاکتیک اسید
شکل دارو : شیاف واژینال
محصولات مشابه : واژیسان
بسته بندی : جعبه ۷ عددی شیاف

موارد مصرف:

شیاف واژینال ۱۵۰ برای حفظ و تنظیم میزان PH طبیعی واژن و به عنوان مکمل درمان دارویی برای جلوگیری از عفونت های واژن در بانوان مستعد عفونت مورد استفاده قرار میگیرد.

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح:

این شیاف فاقد پارافین، وازلین و یا مواد چرب کننده دیگر است.
استفاده از این شیاف در طی دوران قاعدگی توصیه نمی شود. در این دوران درمان را متوقف نمایید.
اگر دچار عفونت واژن هستید و علائمی مانند سوزش و خارش در واژن و افزایش و بد بو شدن ترشحات واژن دارید، بایستی قبل از استفاده از شیاف لاکتیک اسید با پزشک خود مشورت نمایید.
اگر در حین استفاده از این شیاف علائم بدتر شد و یا در عرض ۸ روز بهبود پیدا نکرد، استفاده از این محصول را متوقف کرده و با پزشک مشورت نمایید

موارد منع مصرف:


در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر یک از مواد تشکیل دهنده شیاف با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

شیاف لاکتیک اسید را می توان در دوران بارداری و شیردهی نیز استفاده نمود. بهتر است قبل از استفاده با پزشک مشورت شود
توصیه می شود در هنگام مصرف این شیاف از پد بهداشتی استفاده نمایید.

هشدار:

این دارو صرفاً جهت استعمال واژینال است



مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

نحوه مصرف در دوران بارداری: خانم های باردار نباید در این دوران از اپلیکاتور استفاده نمایند. جهت استعمال شیاف، به پشت دراز کشیده و شیاف را درون واژن وارد نمایید.

نحوه مصرف معمول دارو: ابتدا اپلیکاتور را از بسته خارج نمایید، سپس شیاف را از روکش آن بیرون آورده و در داخل اپلیکاتور قرار دهید. بهتر است به پشت بخوابید و اپلیکاتور را تا حد امکان در واژن وارد نمایید، میله اپلیکاتور را فشار دهید تا شیاف درون واژن قرار گیرد. پس از مصرف، دو قطعه اپلیکاتور را از هم جدا نمایید و با آب گرم و صابون شسته و خشک کنید.

به طور کلی دوره استفاده از این شیاف ۵ تا ۷ روز است.

برای حفظ منظم میزان PH طبیعی واژن در بانوان مستعد عفونت واژن، می توان این شیاف را به مدت ۲ تا ۳ بار در هفته و برای یک دوره طولانی استفاده نمود

عوارض جانبی:

در موارد نادر ممکن است باعث بروز واکنش های پوستی نظیر سرخی، سوزش، خارش و تورم شود.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هر شیاف حاوی ۱۵۰ میلی گرم لاکتیک اسید می باشد.

بسته بندی:

هر جعبه حاوی ۷ شیاف واژینال افورال ۱۵۰ به همراه یک اپلیکاتور و برگه راهنمای مصرف دارو می باشد

آنچه باید در مورد اسید لاکتیک و عفونت های واژن بدانید :

سلول های داخل دیواره واژن حاوی قندهایی هستند که در هنگام ریزش شیمی سلول ها آزاد میشوند. این قندها توسط باکتری های اسید لاکتیک در واژن به اسید لاکتیک تجزیه می گردند. اگر میزان اسید لاکتیک به اندازه کافی باشد محیط واژن به طور طبیعی دارای PH اسیدی برابر با ۳.۸ و ۴.۴ خواهد بود. این شرایط برای رشد باکتری های مضر نامطلوب میباشد، بنابراین محیط اسیدی واژن به جلوگیری از عفونت های باکتریایی کمک میکند.

محیط اسیدی واژن میتواند به دلیل عوامل مختلف خارجی مختل شود و در نتیجه PH آن بالاتر رفته و به بیش از ۵.۴ برسد. عوامل احتمالی عبارتند از ترشحات بدن مانند خون قانندگی یا منی، کاهش لاکتوباسیل ها در اثر استفاده از آنتی بیوتیک ها و نوسان سطح هورمون ها در دوران بارداری ، شیردهی و یا در نتیجه استفاده از هورمون های جنسی زنانه، در چنین شرایطی رشد میکروب های مضر در واژن افزایش میابد. محل پیدایش این میکروب ها ممکن است در اطراف ورودی واژن (یعنی منطقه مقعدی) باشد که داخل واژن برون یا ممکن است در اثر مقاربت جنسی منتقل شوند این امر ممکن است منجر به رشد بیش از حد لاکتوباسیل های طبیعی در اثر وجود این میکروب ها و در نتیجه عفونت واژن شوند. در زنان مستعد به ابتدا به عفونت مکرر واژن استفاده از اسید لاکتیک از طریق واژن میتواند در بسیاری از موارد به تنظیم میزان سطوح PH اسیدی کمک میکند.

